



## Deze pagina niet invullen

<b>Indicatie voor Antistollingsbehandeling</b>
De indicatie bepaalt de intensiteitsgroep waarin de antistollingsbehandeling plaatsvindt:
<b>1e Intensiteitsgroep (1): Therapeutische range INR 2,0 - 3,0</b>
<b>2e Intensiteitsgroep (2): Therapeutische range INR 2,5 - 3,5</b>

INDICATIE	GROEP
<b>Atriumfibrilleren (AF)</b>	
AF, CHA <sub>2</sub> DS <sub>2</sub> -VASc Score $\geq 1$	1
AF + (cerebrale) embolie	1
AF + hartfalen	1
AF + reumatische mitralishartklepstenose	1
AF + recidief systemische embolie tijdens antistolling	1
AF + stent bij acuut coronair syndroom	1
AF + stent bij stabiel coronair lijden	1
<b>Biokleprothese en overige hartchirurgie</b>	
Biokleprothese in mitralispositie	1
Biokleprothese + Risicofactor <sup>1</sup>	1
Mitralishartklepreconstructie	1
Reumatische mitralishartklepstenose + VG <sup>2</sup> systemische embolie	1
Reumatische mitralishartklepstenose + wijd linker atrium >55mm	1
<b>Cardiomyopathie (EF &lt; 35%) in bijzondere gevallen</b>	
Cardiomyopathie + intra-cardiale trombus	2
Cardiomyopathie + aneurysma cordis	1
<b>Cerebrale embolie in bijzondere gevallen</b>	
Cryptogene cerebrale embolie tijdens acetylsalicylzuur / clopidogrel (bij PFO of bij aneurysma atriumseptum)	1
<b>Kunstklep</b>	
Mechanische hartkleprothese oude generatie ongeacht positie	2
Mechanische hartkleprothese ongeacht positie + systemische embolie tijdens adequate antistolling	2
Mechanische aortahartkleprothese	1
Mechanische aortahartkleprothese + Risicofactor <sup>1</sup>	2
Mechanische mitralis hartkleprothese	2
Mechanische mitralis hartkleprothese + Risicofactor <sup>1</sup>	2
Mechanische tricuspidalis hartkleprothese	2
Mechanische tricuspidalis hartkleprothese + Risicofactor <sup>1</sup>	2
Mechanische pulmonalis hartkleprothese	2
Mechanische pulmonalis hartkleprothese + Risicofactor <sup>1</sup>	2

INDICATIE	GROEP
<b>Perifeer arterieel vaatlijden in bijzonder geval</b>	
Perifere arteriële embolie zonder AF	*
Veneuze bypass	1
<b>Pulmonale hypertensie</b>	
Pulmonale hypertensie	1
<b>Primaire Veneuze Trombo-Embolie (VTE)</b>	
Eerste Longembolie	1
Eerste DVT been/bekken	1
Eerste DVT arm	1
Overige locaties	1
<b>Recidief Veneuze Trombo-Embolie (VTE)</b>	
Recidief Longembolie en/of DVT bij adequate cumarinetherapie	2
Recidief Longembolie en/of DVT zonder adequate cumarinetherapie	1
<b>Overige (zeldzame) indicaties</b>	
(Recidiverende) tromboflebitis	*
Overige (zeldzame) indicaties	*
* Op aangeven behandelaar	
1 Risicofactor: vergroot atrium, of (VG) systemische embolie of myocard infarct of lage ejectiefractie of atriumfibrilleren	
2 Voorgeschiedenis	