

Deze pagina niet invullen

Indicatie voor Antistollingsbehandeling
De indicatie bepaalt de intensiteitsgroep waarin de antistollingsbehandeling plaatsvindt:
1e Intensiteitsgroep (1): Therapeutische range INR 2,0 - 3,0
2e Intensiteitsgroep (2): Therapeutische range INR 2,5 - 3,5

INDICATIE	GROEP
Atriumfibrilleren (AF)	
AF, CHA ₂ DS ₂ -VAsC Score ≥ 1	1
AF + (cerebrale) embolie	1
AF + hartfalen	1
AF + reumatische mitralishartklepstenose	1
AF + recidief systemische embolie tijdens antistolling	1
AF + stent bij acuut coronair syndroom	1
AF + stent bij stabiel coronair lijden	1
Biokleprothese en overige hartchirurgie	
Biokleprothese in mitralispositie	1
Biokleprothese + Risicofactor ¹	1
Mitralishartklepreconstructie	1
Reumatische mitralishartklepstenose + VG ² systemische embolie	1
Reumatische mitralishartklepstenose + wijd linker atrium >55mm	1
Cardiomyopathie (EF < 35%) in bijzondere gevallen	
Cardiomyopathie + intra-cardiale trombus	2
Cardiomyopathie + aneurysma cordis	1
Cerebrale embolie in bijzondere gevallen	
Cryptogene cerebrale embolie tijdens acetylsalicylzuur / clopidogrel (bij PFO of bij aneurysma atriumseptum)	1
Kunstklep	
Mechanische hartkleprothese oude generatie ongeacht positie	2
Mechanische hartkleprothese ongeacht positie + systemische embolie tijdens adequate antistolling	2
Mechanische aortahartkleprothese	1
Mechanische aortahartkleprothese + Risicofactor ¹	2
Mechanische mitralis hartkleprothese	2
Mechanische mitralis hartkleprothese + Risicofactor ¹	2
Mechanische tricuspidalis hartkleprothese	2
Mechanische tricuspidalis hartkleprothese + Risicofactor ¹	2
Mechanische pulmonalis hartkleprothese	2
Mechanische pulmonalis hartkleprothese + Risicofactor ¹	2

INDICATIE	GROEP
Perifeer arterieel vaatlijden in bijzonder geval	
Perifere arteriële embolie zonder AF	*
Veneuze bypass	1
Pulmonale hypertensie	
Pulmonale hypertensie	1
Primaire Veneuze Trombo-Embolie (VTE)	
Eerste Longembolie	1
Eerste DVT been/bekken	1
Eerste DVT arm	1
Overige locaties	1
Recidief Veneuze Trombo-Embolie (VTE)	
Recidief Longembolie en/of DVT bij adequate cumarinetherapie	2
Recidief Longembolie en/of DVT zonder adequate cumarinetherapie	1
Overige (zeldzame) indicaties	
(Recidiverende) tromboflebitis	*
Overige (zeldzame) indicaties	*
* Op aangeven behandelaar	
1 Risicofactor: vergroot atrium, of (VG) systemische embolie of myocard infarct of lage ejectiefractie of atriumfibrilleren	
2 Voorgeschiedenis	