

Instructies voor insturen her-aanmeldformulier

Dit formulier kunt u naar De Nationale Trombose Dienst sturen op de volgende manieren:

1. Naar het mailadres ma@ntd.nl voorzien van uw eigen e-mailbeveiliging
2. Een beveiligde e-mail versturen via <https://www.ntd.nl/professional/contact/> u kunt dan kiezen voor “Start veilig bericht aan Medische Administratie”.



	Hoofdbehandelaar:
	Verwijzend arts:
	Specialisme:
	Ziekenhuis:
	Telefoonnummer:
	Opnamedatum:
	Opnamereden:
	Ontslagdatum:

Antistollingsindicatie (zie voor informatie volgende pagina)			
Indicatie na opname gewijzigd? ☐ Nee ☐ Ja			
Indien hartklepprothese: welk type:		Locatie:	
Intensiteitsgroep na opname gewijzigd? ☐ Nee ☐ Ja naar intensiteitsgroep ☐ Groep 1 ☐ Groep 2			
Afwijkende intensiteit?: ☐ Nee ☐ Ja, gewenste intensiteit:		Reden:	
Duur van de behandeling?:		weken	maanden
		jaren of onbepaald	
Gewenste stopdatum?:			
Mag de behandeling automatisch gestaakt worden? ☐ Nee ☐ Ja			
Is de cliënt opgenomen met een ernstige bloedige of trombotische complicatie? ☐ Nee ☐ Ja			

Voorgescreven anticoagulans: ☐ Fenprocoumon ☐ Acenocoumarol ☐ Anders, welke													
Startdatum													
INR*													
Dosering (tabl.)*													
*Indien mogelijk graag opgeven vanaf startdatum													

(LMW) Heparine ☐ Nee ☐ Ja, startdatum:	Einddatum:
Naam LMWH:	Dosering:
LMWH staken bij een INR van:	
Trombocytenaggregatieremmers ☐ Nee ☐ Ja, welke:	Tot wanneer?:
Zwangerschap ☐ Nee ☐ Ja, vermoedelijke bevallingsdatum:	
Overige medicaties:	

Overige opmerkingen:

Risico verhogende factoren		
☐ Verhoogde bloedingsneiging	☐ Nierinsufficiëntie	☐ Diabetische retinopathie met bloedingen en/of neovascularisatie
☐ Malabsorptie syndroom	☐ Wisselende mate van hartfalen	
☐ Maligniteit	☐ (recent) Bloedende laesie in de tractus digestivus	
☐ Onvoldoende geregelde hypertensie		
☐ Recente intracerebrale bloeding		
		☐ Overige

Verplicht	Naam en handtekening verwijzend arts	Datum

Deze pagina niet invullen

Indicatie voor Antistollingsbehandeling
De indicatie bepaalt de intensiteitsgroep waarin de antistollingsbehandeling plaatsvindt:
1e Intensiteitsgroep (1): Therapeutische range INR 2,0 - 3,0
2e Intensiteitsgroep (2): Therapeutische range INR 2,5 - 3,5

INDICATIE	GROEP
Atriumfibrilleren (AF)	
AF, CHA ₂ DS ₂ -VASc Score ≥ 1	1
AF + (cerebrale) embolie	1
AF + hartfalen	1
AF + reumatische mitralishartklepstenose	1
AF + recidief systemische embolie tijdens antistolling	1
AF + stent bij acuut coronair syndroom	1
AF + stent bij stabiel coronair lijden	1
Bioklepprothese en overige hartchirurgie	
Bioklepprothese in mitralispositie	1
Bioklepprothese + Risicofactor ¹	1
Mitralishartklepreconstructie	1
Reumatische mitralishartklepstenose + VG ² systemische embolie	1
Reumatische mitralishartklepstenose + wijd linker atrium >55mm	1
Cardiomyopathie (EF < 35%) in bijzondere gevallen	
Cardiomyopathie + intra-cardiale trombus	2
Cardiomyopathie + aneurysma cordis	1
Cerebrale embolie in bijzondere gevallen	
Cryptogene cerebrale embolie tijdens acetylsalicylzuur / clopidogrel (bij PFO of bij aneurysma atriumseptum)	1
Kunstklep	
Mechanische hartklepprothese oude generatie ongeacht positie	2
Mechanische hartklepprothese ongeacht positie + systemische embolie tijdens adequate antistolling	2
Mechanische aortahartklepprothese	1
Mechanische aortahartklepprothese + Risicofactor ¹	2
Mechanische mitralis hartklepprothese	2
Mechanische mitralis hartklepprothese + Risicofactor ¹	2
Mechanische tricuspidalis hartklepprothese	2
Mechanische tricuspidalis hartklepprothese + Risicofactor ¹	2
Mechanische pulmonalis hartklepprothese	2
Mechanische pulmonalis hartklepprothese + Risicofactor ¹	2

INDICATIE	GROEP
Perifeer arterieel vaatlijden in bijzonder geval	
Perifere arteriële embolie zonder AF	*
Veneuze bypass	1
Pulmonale hypertensie	
Pulmonale hypertensie	1
Primaire Veneuze Trombo-Embolie (VTE)	
Eerste Longembolie	1
Eerste DVT been/bekken	1
Eerste DVT arm	1
Overige locaties	1
Recidief Veneuze Trombo-Embolie (VTE)	
Recidief Longembolie en/of DVT bij adequate cumarinetherapie	2
Recidief Longembolie en/of DVT zonder adequate cumarinetherapie	1
Overige (zeldzame) indicaties	
(Recidiverende) tromboflebitis	*
Overige (zeldzame) indicaties	*
* Op aangeven behandelaar	
1 Risicofactor: vergroot atrium, of (VG) systemische embolie of myocard infarct of lage ejectiefraction of atriumfibrilleren	
2 Voorgeschiedenis	